



Tratamento do eritema nodoso hansênico na mulher em idade fértil

Letícia Lisboa Machado¹, Karina Tiemi Kakizaki², Thyago dos Santos Amorim³, Estefânia C. Carmo Sousa⁴

Tipo de trabalho: Relato de experiência
Modalidade da inscrição: Pôster Digital
Classificação CIAP2/Código Q: A78/S29/QR36

RESUMO

Os estados reacionais ou reações hansênicas (tipos 1 e 2) são alterações do sistema imunológico que se exteriorizam como manifestações inflamatórias agudas e subagudas, que ocorrem em pacientes com diagnóstico de hanseníase, principalmente nos pacientes Multibacilar (MB). Elas podem surgir antes, durante ou depois do tratamento poliquimioterápico (PQT). Na reação tipo 2, a manifestação mais frequente é o Eritema Nodoso Hansênico, que se caracteriza pelo aparecimento de nódulos subcutâneos dolorosos, acompanhados ou não de manifestações sistêmicas (BRASIL, 2016). Trata-se do relato de caso de uma mulher em idade fértil com Eritema Nodoso Hansênico. Tem-se como metodologia o relato de experiência do Tratamento de Reação Hansênica Tipo II em uma Unidade de Saúde da Família. A paciente J.P.O, 37 anos, diagnóstico de Hanseníase em agosto de 2019, com início do tratamento PQT Multibacilar (PQT-MB), protocolo básico Rifampicina, Dapsona, Clofazimina, tratamento de 12 meses. Durante a 4ª cartela do tratamento, a paciente apresentou reação adversa a Dapsona, sendo necessário a suspensão do tratamento por 15 dias e após o evento, houve a troca do esquema básico para Ofloxacino. Em janeiro de 2020, a paciente vem à consulta com queixa de nódulos dolorosos pelo corpo. Diante do achado, esta foi encaminhada para o Centro de Referência do município para avaliação e início do tratamento. A opção do tratamento foi, inicialmente, Pentoxifilina 400 mg. Optou-se por esta por ser mulher em idade fértil, devido aos riscos teratogênicos da Talidomida, que seria a primeira escolha de tratamento - associado também a pulsoterapia com corticoide.

¹ Secretaria Municipal de Saúde de Sinop – MT; leticia.lisboah@hotmail.com

² Secretaria Municipal de Saúde de Sinop – MT; drakarinakakizaki@gmail.com

³ Secretaria Municipal de Saúde de Sinop – MT; heythyago@gmail.com

⁴ Secretaria Municipal de Saúde de Sinop – MT; stefanyasousa@hotmail.com

Após completar esquema, houve regressão dos nódulos e melhora do quadro. Dessa forma, conclui-se que o manejo segue as orientações do Ministério da Saúde, com esquema substitutivo para a reação tipo 2 a Pentoxifilina, uma vez que a talidomida é contraindicada em mulheres férteis, ou só deve ser prescrita mediante dois métodos efetivos de contracepção e exclusão da gravidez.

PALAVRAS-CHAVE: Hanseníase. Eritema Nodoso. Mulheres. Fertilidade. Tratamento.

REFERÊNCIA

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da Hanseníase como problema de saúde pública. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.